

# Лекция 4. Вариационные методы. Полуограниченные функционалы.

Корпусов Максим Олегович

Курс лекций по нелинейному функциональному анализу

29 сентября 2011 г.

пусть  $\mathbb{B}$  — это некоторое банахово пространство относительно нормы  $\| \cdot \|$  и скобками двойственности  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  между  $\mathbb{B}$  и его сопряженным  $\mathbb{B}^*$ . Пусть на этом банаховом пространстве  $\mathbb{B}$  задан некоторый (нелинейный) функционал

$$\psi : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{R}^1.$$

Будем как и в предыдущей лекции обозначать символом  $\psi'_f(u)$  производную Фреше.

**Определение 1.** *Градиентом функционала  $\psi$  в некоторой точке  $u \in \mathbb{B}$  назовем его производную Фреше в этой точке:*

$$\psi'_f(u) = \mathbf{grad}_f \psi(u) : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}^* \quad (1)$$

**Определение 2.** *Оператор*

$$\mathbb{F} : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}^*$$

*называется потенциальным, если найдется такой дифференцируемый по Фреше функционал*

$$\psi(u) : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{R}^1,$$

что

$$\mathbb{F}(u) = \mathbf{grad}_f \psi(u). \quad (2)$$

# Потенциальные операторы.

Естественно, возникает вопрос о достаточных условиях потенциальности заданного оператора  $\mathbb{F}$  :

$$\mathbb{F} : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}^*.$$

Для ответа на этот вопрос нам необходимо ввести понятие *локальной непрерывности по Липшицу*. Дадим определение.

**Определение 3.** Оператор  $\mathbb{F}$ , действующий из одного банахова пространства  $\mathbb{B}_1$  в другое банахово пространство  $\mathbb{B}_2$ , называется *локально по Липшицу непрерывным*, если для каждого  $R > 0$  имеет место следующее неравенство:

$$\|\mathbb{F}(u_1) - \mathbb{F}(u_2)\|_2 \leq c(R)\|u_1 - u_2\|_1 \quad \text{для всех } u_1, u_2 \in \mathbb{B}_1 \quad (3)$$

таких, что

$$\|u_k\|_1 \leq R \quad \text{при } k = 1, 2.$$

# Теорема о потенциальном операторе

## Теорема

Локально непрерывный по Липшицу оператор  $\mathbb{F} : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}^*$ , потенциален тогда и только тогда, когда для всех  $u, v \in \mathbb{B}$  имеет место равенство

$$\begin{aligned} \int_0^1 \langle \mathbb{F}(tu), u \rangle dt - \int_0^1 \langle \mathbb{F}(tv), v \rangle dt = \\ = \int_0^1 \langle \mathbb{F}(tu + (1-t)v), u - v \rangle dt \quad \text{при } u, v \in \mathbb{B}. \quad (4) \end{aligned}$$

$$\psi(u) = \psi(\theta) + \int_0^1 \langle \mathbb{F}(tu), u \rangle dt \quad \text{для всех } u \in \mathbb{B}. \quad (5)$$

## Доказательство теоремы

Итак, пусть оператор  $\mathbb{F}$  сильно потенциален, тогда найдется дифференцируемый по Фреше функционал

$$\psi(u) : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{R}^1$$

такой, что

$$\mathbb{F}(u) = \mathbf{grad}_f \psi(u).$$

В этом случае справедлива следующая формула:

$$\begin{aligned} \psi(u) - \psi(v) &= \int_0^1 \frac{d}{dt} \psi(tu + (1-t)v) dt = \int_0^1 \langle \psi'_f(tu + (1-t)v), u - v \rangle dt \\ &= \int_0^1 \langle \mathbb{F}(tu + (1-t)v), u - v \rangle dt \quad (6) \end{aligned}$$

## Доказательство теоремы

Положим в равенстве (6) сначала  $v = \theta \in \mathbb{B}$ , тогда получим следующее равенство:

$$\psi(u) = \psi(\theta) + \int_0^1 \langle \mathbb{F}(tu), u \rangle dt. \quad (7)$$

Теперь положим в равенстве (6)  $u = \theta$  и получим тогда следующее равенство:

$$\psi(v) = \psi(\theta) + \int_0^1 \langle \mathbb{F}(tv), v \rangle dt. \quad (8)$$

С учетом равенств (7) и (8) получим следующее выражение:

$$\psi(u) - \psi(v) = \int_0^1 \langle \mathbb{F}(tu), u \rangle dt - \int_0^1 \langle \mathbb{F}(tv), v \rangle dt. \quad \boxtimes$$

## Доказательство теоремы

Пусть теперь для оператора  $\mathbb{F}$  выполнено равенство (4).  
Определим функционал  $\psi(u)$  равенством

$$\psi(u) = \psi(\theta) + \int_0^1 \langle \mathbb{F}(tu), u \rangle dt. \quad (9)$$

Докажем, что функционал  $\psi(u)$  дифференцируем по Фреше и его производная Фреше равна  $\mathbb{F}(u)$ . Действительно, имеет место цепочка следующих равенств:

$$\begin{aligned} \psi(u+h) - \psi(u) &= \int_0^1 \langle \mathbb{F}(t(u+h)), u+h \rangle dt - \int_0^1 \langle \mathbb{F}(tu), u \rangle dt = \\ &= \int_0^1 \langle \mathbb{F}(t(u+h) + (1-t)u), h \rangle dt. \quad (10) \end{aligned}$$



# Доказательство теоремы

Введем следующее обозначение:

$$\omega(u, h) \equiv \psi(u + h) - \psi(u) - \langle \mathbb{F}(u), h \rangle.$$

Но тогда для  $\omega(u, h)$  справедливо неравенство:

$$\begin{aligned} |\omega(u, h)| &\leq \int_0^1 |\langle \mathbb{F}(t(u + h) + (1 - t)u) - \mathbb{F}(u), h \rangle| dt \leq \\ &\leq \int_0^1 \|\mathbb{F}(t(u + h) + (1 - t)u) - \mathbb{F}(u)\|_* \|h\| dt \leq \\ &\leq c(R) \int_0^1 \|t(u + h) + (1 - t)u - u\| \|h\| dt = c(R) \|h\|^2 \frac{1}{2} \end{aligned}$$

для всех  $u, h \in \mathbb{B}$ , для которых

$$\|u\| \leq R \quad \text{и} \quad \|h\| \leq R. \quad \square$$

Следовательно, приходим к выводу, что

$$\lim_{\|h\| \rightarrow 0} \frac{|\omega(u, h)|}{\|h\|} = 0.$$

Тем самым, функционал  $\psi(u)$  дифференцируем по Фреше на каждом шаре  $\|u\| \leq R$  и его производная Фреше равна

$$\psi'_f(u) = \mathbb{F}(u).$$

ТЕОРЕМА ДОКАЗАНА.

Давайте зададимся вопросом о нахождении решений следующего операторного уравнения:

$$\mathbb{F}(u) = \theta \in \mathbb{B}^*, \quad u \in \mathbb{B}. \quad (11)$$

Предположим, что оператор  $\mathbb{F}$  потенциален и его потенциал — это функционал  $\psi(u)$ . Дадим определение.

**Определение 4.** Пусть  $M \subset \mathbb{B}$  — некоторое непустое и замкнутое подмножество. Точка  $\hat{u} \in M$  называется точкой экстремума функционала  $\psi(u)$  на  $M$ , если

$$\inf_{u \in M} \psi(u) = \psi(\hat{u}) \quad \text{либо} \quad \sup_{u \in M} \psi(u) = \psi(\hat{u}).$$

## Вариационная постановка операторных уравнений-2

Теперь рассмотрим следующую функцию

$$\varphi(t) = \psi(\hat{u} + th) \quad \text{при} \quad t \in (-1, 1),$$

где  $\hat{u}$  — это точка экстремума функционала  $\psi(\cdot)$  на множестве  $M = \mathbb{B}$ . Тогда функция  $\varphi(t)$  достигает экстремума в точке  $t = 0$ . В силу дифференцируемости функционала  $\psi(u)$  по Фреше в точке  $\hat{u} \in \mathbb{B}$  приходим к выводу, что  $\varphi(t)$  дифференцируема в точке  $t = 0$ . Но тогда необходимым условием экстремума является следующее

$$\varphi'(0) = 0 \Rightarrow \langle \psi'_f(\hat{u}), h \rangle = 0 \quad \forall h \in \mathbb{B} \Rightarrow \psi'_f(\hat{u}) = \theta \in \mathbb{B}^* \Rightarrow \mathbb{F}(\hat{u}) = \theta.$$

## Лемма

Пусть функционал  $\psi(u)$  дважды непрерывно дифференцируем по Фреше для каждого  $u \in M$  и для каждого  $h \in \mathbb{B}$  такого, что  $u + th \in M$  для всех  $t \in [0, 1]$  имеет место следующее выражение:

$$\psi(u+h) = \psi(u) + \langle \psi'_f(u), h \rangle + \frac{1}{2} \langle \psi''_{ff}(u)h, h \rangle + \omega_2(u, h), \quad (12)$$

где для  $\omega_2(u, h)$  выполнено следующее предельное равенство:

$$\lim_{\|h\| \rightarrow 0} \frac{|\omega_2(u, h)|}{\|h\|^2} = 0. \quad (13)$$

# Доказательство леммы-1

Итак, пусть

$$\psi''_{ff}(u)$$

существует и равномерно непрерывна на  $M \subset \mathbb{B}$ . Заметим, что для  $\psi'_f(u)$  в силу дифференцируемости по Фреше справедливо следующее равенство:

$$\psi'_f(u+h) = \psi'_f(u) + \psi''_{ff}(u)h + \omega_1(u, h),$$

где

$$\lim_{\|h\| \rightarrow 0} \frac{\|\omega_1(u, h)\|_*}{\|h\|} = 0$$

при  $u \in M$  и любом  $h \in \mathbb{B}$  таком, что  $u+h \in M$  при достаточно малых по норме  $h$ .

Поэтому справедлива следующая цепочка равенств:

$$\begin{aligned}\psi(u+h) - \psi(u) &= \int_0^1 \frac{d}{dt} \psi(u+th) = \int_0^1 \langle \psi'_f(u+th), h \rangle dt = \\ &= \int_0^1 \langle \psi'_f(u) + t\psi''_{ff}(u)h, h \rangle dt + \omega_2(u, h),\end{aligned}$$

где

$$\omega_2(u, h) = \int_0^1 \langle \omega_1(u, th), h \rangle dt.$$

## Доказательство леммы-3

Значит, отсюда приходим к следующему равенству:

$$\begin{aligned}\psi(u+h) - \psi(u) &= \langle \psi'_f(u), h \rangle + \langle \psi''_{ff}(u)h, h \rangle \int_0^1 t dt + \omega_2(u, h) = \\ &= \langle \psi'_f(u), h \rangle + \frac{1}{2} \langle \psi''_{ff}(u)h, h \rangle + \omega_2(u, h),\end{aligned}$$

где для  $\omega_2(u, h)$  справедливо следующее представление:

$$\omega_2(u, h) = \int_0^1 \langle \omega_1(u, th), h \rangle dt.$$

Стало быть, приходим к неравенству

$$|\omega_2(u, h)| \leq \int_0^1 \|\omega_1(u, th)\|_* \|h\| dt.$$



Поэтому справедливо следующее предельное неравенство:

$$\lim_{\|h\| \rightarrow 0} \frac{|\omega_2(u, h)|}{\|h\|^2} \leq \lim_{\|h\| \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{\|\omega_1(u, th)\|_*}{\|h\|} dt = 0.$$

Тем самым, лемма доказана.

## Лемма

Пусть функционал  $\psi(u)$ , дважды дифференцируемый по Фреше в некоторой окрестности точки  $\hat{u} \in \mathbb{B}$ , имеет равномерно непрерывную в этой окрестности точки  $\hat{u}$  вторую производную Фреше, тогда необходимыми условиями минимума(максимума) в этой точке  $\hat{u}$  являются следующие

$$\psi'_f(\hat{u}) = 0 \quad \text{и} \quad \langle \psi''_f(\hat{u})h, h \rangle \geq 0 \quad (\leq 0) \quad \forall h \in \mathbb{B}. \quad (14)$$

## Доказательство леммы-1

Рассмотрим разложение функционала  $\psi(u)$  в окрестности точки экстремума  $\hat{u} \in \mathbb{B}$ :

$$\psi(\hat{u} + h) = \psi(\hat{u}) + \langle \psi'_f(\hat{u}), h \rangle + \frac{1}{2} \langle \psi''_{ff}(\hat{u})h, h \rangle + \omega_2(\hat{u}, h).$$

Но как мы доказали ранее в точке  $\hat{u}$  имеет место равенство

$$\psi'_f(\hat{u}) = 0,$$

поэтому приходим к следующему равенству:

$$\psi(\hat{u} + h) - \psi(\hat{u}) = \frac{1}{2} \langle \psi''_{ff}(\hat{u})h, h \rangle + \omega_2(\hat{u}, h). \quad (15)$$

## Доказательство леммы-2

Предположим, что  $\hat{u}$  — это точка локального минимума (максимума), но для некоторого  $h_1 \in \mathbb{B}$  имеет место следующее неравенство:

$$\langle \psi''_{ff}(\hat{u})h_1, h_1 \rangle < 0 (> 0).$$

Тогда для  $h = \varepsilon h_1$  при  $\varepsilon > 0$  имеет место следующее выражение:

$$\langle \psi''_{ff}(\hat{u})h, h \rangle = \varepsilon^2 \langle \psi''_{ff}(\hat{u})h_1, h_1 \rangle < 0 (> 0).$$

Теперь, выбирая  $\varepsilon > 0$  сколь угодно малым, получим, что в любой окрестности точки  $\hat{u} \in \mathbb{B}$  найдется точка  $\varepsilon h_1 \in \mathbb{B}$ , что

$$\psi(\hat{u} + \varepsilon h_1) - \psi(\hat{u}) < 0 (> 0),$$

т. е. в точке  $\hat{u} \in \mathbb{B}$  нет минимума (максимума).

Следовательно, необходимым условием минимума (максимума) в точке  $\hat{u} \in \mathbb{B}$  есть условие

$$\langle \psi''_{ff}(\hat{u})h, h \rangle \geq 0 (\leq 0) \quad \text{для всех } h \in \mathbb{B}.$$

Лемма доказана.

## Один пример

Рассмотрим следующий функционал на банаховом пространстве  $\mathbb{C}[0, 1]$  относительно стандартной supremum-нормы:

$$\psi(u) = \int_0^1 u^2(x)(x - u(x)) dx.$$

Справедлива следующая цепочка равенств:

$$\begin{aligned} \psi(u + h) &= \int_0^1 (u + h)^2(x - u - h) dx = \int_0^1 u^2(x - u) dx + \\ &+ \int_0^1 (2ux - 3u^2) h dx + \int_0^1 (x - 3u)h^2 dx - \int_0^1 h^3 dx. \end{aligned}$$

## Один пример. Продолжение 1.

Из этого равенства приходим к выводу, что

$$\psi'_f(u) = 0$$

на двух функциях

$$u(x) = 0 \quad \text{и} \quad u(x) = \frac{2}{3}x.$$

Заметим теперь, что

$$\langle \psi''_{ff}(0)h, h \rangle = 2 \int_0^1 h^2(x)x \, dx \geq 0 \quad \text{для всех} \quad h(x) \in \mathbb{C}[0, 1],$$

причем,

$$\psi(0) = 0,$$

т. е. на функции  $u(x) = 0$  выполнены все необходимые условия локального минимума, но, тем не менее, на функции  $u(x) = 0$  функционал не достигает локального минимума.

## Один пример. Продолжение 2.

Действительно, рассмотрим следующее однопараметрическое семейство функций:

$$u_\varepsilon(x) = \begin{cases} \varepsilon - x, & \text{при } x \in [0, \varepsilon]; \\ 0, & \text{при } x \geq \varepsilon. \end{cases}$$

Очевидно, что функция  $u_\varepsilon(x) \in \mathbb{C}[0, 1]$  для всех  $\varepsilon \in (0, 1)$ .  
Теперь вычислим норму этой функции

$$\sup_{x \in [0, 1]} |u_\varepsilon(x)| = \varepsilon \rightarrow 0 \quad \text{при } \varepsilon \rightarrow 0,$$

т. е. в любой окрестности функции  $u(x) = 0 \in \mathbb{C}[0, 1]$  содержится функция  $u_\varepsilon(x) \in \mathbb{C}[0, 1]$  при некотором  $\varepsilon > 0$ .



## Один пример. Продолжение 3.

Теперь вычислим значение функционала  $\psi(\cdot)$  на функции  $u_\varepsilon(x)$ . Действительно, имеем

$$\psi(u_\varepsilon(x)) = \int_0^1 u_\varepsilon^2(x) (x - u_\varepsilon(x)) = -\frac{\varepsilon^4}{6} < 0 = \psi(0).$$

Тем самым, минимум у функционала  $\psi(u)$  на функции  $u(x) = 0$  не достигается.

## Теорема

Пусть  $\psi(u) : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{R}^1$  — это дважды дифференцируемый по Фреше в некоторой окрестности точки  $\hat{u} \in \mathbb{B}$  функционал, причем вторая производная Фреше равномерно непрерывна в этой окрестности точки  $\hat{u}$ . Тогда при условиях

$$(I) \quad \psi'_f(\hat{u}) = 0;$$

$$(II) \quad \left\langle \psi''_{ff}(\hat{u})h, h \right\rangle \geq c\|h\|^2 \quad (\leq -c\|h\|^2) \text{ для всех } h \in \mathbb{B} \text{ и} \\ c = c(\hat{u}) > 0$$

в точке  $\hat{u} \in \mathbb{B}$  у функционала  $\psi(\hat{u})$  достигается минимум (максимум).

# Доказательство теоремы-1

Докажем достаточность условий для минимума функционала  $\psi(u)$  в точке  $\hat{u}$ , поскольку достаточность условий для максимума проверяется аналогичным образом. Действительно, с одной стороны, в силу условий теоремы имеет место представление в окрестности точки  $\hat{u} \in \mathbb{B}$  :

$$\psi(\hat{u} + h) - \psi(\hat{u}) = \langle \psi'_f(\hat{u}), h \rangle + \frac{1}{2} \langle \psi''_{ff}(\hat{u})h, h \rangle + \omega_2(u, h). \quad (16)$$

## Доказательство теоремы-2

Кроме того, поскольку имеет место предельное равенство

$$\lim_{\|h\| \rightarrow 0} \frac{|\omega_2(u, h)|}{\|h\|^2} = 0,$$

то при достаточно малом  $\|h\|$  для заданного  $c > 0$  будет иметь место неравенство

$$|\omega_2(u, h)| < \frac{c}{4} \|h\|^2.$$

Тогда из (16) получим неравенство для таких  $h \in \mathbb{B}$ :

$$\psi(\hat{u}+h) - \psi(\hat{u}) \geq \frac{1}{2} \langle \psi''_{ff}(\hat{u})h, h \rangle - \frac{c}{4} \|h\|^2 \geq \frac{c}{2} \|h\|^2 - \frac{c}{4} \|h\|^2 = \frac{c}{4} \|h\|^2,$$

т. е. в точке  $\hat{u} \in \mathbb{B}$  достигается минимум у функционала  $\psi$ .

**Определение 5.** Подмножество  $M \subset \mathbb{B}$  банахова пространства называется выпуклым, если для любых  $u, v \in M$  и всех  $t \in [0, 1]$  имеет место вложение  $tu + (1 - t)v \in M$ .

**Определение 6.** Функционал  $\psi(u) : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{R}^1$  называется выпуклым на выпуклом множестве  $M \subset \mathbb{B}$ , если для всех  $u, v \in M$  и всех  $t \in [0, 1]$  имеет место неравенство:

$$\psi(tu + (1 - t)v) \leq t\psi(u) + (1 - t)\psi(v).$$

Теперь дадим определение *слабо секвенциально полунепрерывного снизу* функционала:

**Определение 7.** Будем говорить, что функционал  $\psi(u) : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{R}^1$  является *слабо секвенциально полунепрерывным снизу* в точке  $u_0 \in M \subset \mathbb{B}$  по отношению к  $M \subset \mathbb{B}$ , если для любой последовательности  $\{u_n\} \subset M$  такой, что

$$u_n \rightharpoonup u_0 \quad \text{слабо в } \mathbb{B}$$

вытекает, что

$$\psi(u_0) \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \psi(u_n).$$

**Определение 8.** Будем говорить, что функционал  $\psi(u) : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{R}^1$  является слабо секвенциально полунепрерывным снизу на  $M \subset \mathbb{B}$ , если он является слабо секвенциально полунепрерывным снизу в каждой точке  $u \in M$ .

Напомним определение слабо секвенциально компактного множества  $M$ .

**Определение 9.** Подмножество  $M$  банахова пространства  $\mathbb{B}$  называется слабо секвенциально компактным, если из каждой последовательности  $\{u_n\} \subset M$  можно выделить слабо сходящуюся на  $M$  подпоследовательность  $\{u_{n_k}\} \subset \{u_n\}$  :

$$u_{n_k} \rightharpoonup u_0 \in M \quad \text{слабо в } \mathbb{B}.$$

## Теорема

Пусть  $M$  — это слабо секвенциально компактное подмножество банахова пространства  $\mathbb{B}$  и  $\psi(u) : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{R}^1$  является слабо секвенциально полунепрерывным снизу функционалом на  $M$ . Тогда функционал  $\psi$  ограничен снизу на  $M$  и достигает в некоторой точке  $u_0 \in M$  свой минимум на  $M$ :

$$\psi(u_0) = \inf_{u \in M} \psi(u).$$



# Доказательство теоремы-1

Итак, пусть  $\{u_n\} \subset M$  — это минимизирующая последовательность функционала  $\psi$  по отношению к  $M \subset \mathbb{B}$ . Тогда

$$\psi(u_n) \rightarrow \inf_{u \in M} \psi(u) \quad \text{при} \quad n \rightarrow +\infty.$$

Поскольку  $M$  слабо секвенциально компактно, то найдется такая подпоследовательность  $\{u_{n_k}\} \subset \{u_n\}$ , что

$$u_{n_k} \rightharpoonup u_0 \in M \quad \text{слабо в} \quad \mathbb{B}.$$

Но тогда в силу слабой секвенциальной полунепрерывности снизу функционала  $\psi$  на  $M$  имеет место неравенство

$$\psi(u_0) \leq \liminf_{k \rightarrow +\infty} \psi(u_{n_k}).$$

Тогда справедлива следующая цепочка неравенств:

$$\inf_{u \in M} \psi(u) \leq \psi(u_0) \leq \liminf_{k \rightarrow +\infty} \psi(u_{n_k}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \psi(u_n) = \inf_{u \in M} \psi(u),$$

из которой следует, что

$$\psi(u_0) = \inf_{u \in M} \psi(u) > -\infty.$$

Теорема доказана.

# Слабо коэрцитивные функционалы

**Определение 10.** Функционал  $\psi(u) : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{R}^1$ , удовлетворяющий условию

$$\lim_{\|u\| \rightarrow +\infty} \psi(u) = \infty,$$

называется слабо коэрцитивным.

Справедлива следующая важная теорема.

## Теорема

Пусть  $\mathbb{B}$  — это рефлексивное банахово пространство, а  $M \subset \mathbb{B}$  — это слабо секвенциально замкнутое подмножество, тогда если функционал  $\psi(u) : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{R}^1$  является слабо коэрцитивным на  $M$  и секвенциально слабо полунепрерывным снизу функционалом на  $M$ , то он ограничен снизу на  $M$  и достигает своего минимума на  $M$ :

$$\psi(u_0) = \inf_{u \in M} \psi(u) > -\infty.$$

# Доказательство теоремы-1

Пусть

$$\alpha_0 = \inf_{u \in M} \psi(u)$$

и  $\{u_n\} \subset M$  — это минимизирующая последовательность для функционала  $\psi$  :

$$\psi(u_n) \rightarrow \alpha_0 \quad \text{при} \quad n \rightarrow +\infty.$$

Поскольку числовая последовательность  $\{\psi(u_n)\}$  является сходящейся, то она ограничена, но в силу слабой коэрцитивности функционала  $\psi$  на  $M$  имеем

$$\psi(u) \rightarrow \infty \quad \text{при} \quad \|u\| \rightarrow +\infty.$$

Следовательно,  $\|u_n\| \leq R$  при некотором  $R > 0$ , не зависящем от  $n \in \mathbb{N}$ .

## Доказательство теоремы-2

Поскольку банахово пространство  $\mathbb{B}$  является рефлексивным, то по теореме 4 Лекции 1 каждое ограниченное по норме множество слабо секвенциально относительно компактно. Поэтому без ограничения общности можно считать, что последовательность

$$u_n \rightharpoonup u_0 \quad \text{слабо в } \mathbb{B}.$$

Но  $\{u_n\} \subset M$  и  $M$  слабо замкнуто, поэтому  $u_0 \in M$ . С другой стороны, в силу слабой секвенциальной полунепрерывности снизу функционала  $\psi$  на  $M$  приходим к выводу, что

$$\psi(u_0) \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \psi(u_n).$$

## Доказательство теоремы-3

Таким образом, приходим к выводу, что имеет место цепочка неравенств:

$$\inf_{u \in M} \psi(u) \leq \psi(u_0) \leq \liminf_{k \rightarrow +\infty} \psi(u_{n_k}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \psi(u_n) = \inf_{u \in M} \psi(u),$$

из которой следует, что

$$\psi(u_0) = \inf_{u \in M} \psi(u) > -\infty.$$

Теорема доказана.

# Необходимое и достаточное условие слабой секвенциальной полунепрерывности функционала

## Лемма

*Пусть  $M \subset \mathbb{B}$ , тогда для того чтобы функционал  $\psi$  был слабо секвенциально полунепрерывным снизу, необходимо и достаточно, чтобы для каждого  $a \in \mathbb{R}^1$  множество*

$$E(a) \equiv \{u \in M : \psi(u) \leq a\}$$

*было слабо секвенциально замкнуто в  $M$ .*

## Доказательство леммы-1

Итак, пусть  $\psi(u)$  является слабо секвенциально полунепрерывным снизу на  $M \subset \mathbb{B}$ . Пусть  $\{u_n\} \subset E(a)$  при некотором  $a \in \mathbb{R}^1$ . Тогда из условия, что

$$u_n \rightharpoonup u_0 \in M \quad \text{слабо в } \mathbb{B}$$

вытекает, что

$$\psi(u_0) \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \psi(u_n) \leq a,$$

т. е.  $u_0 \in E(a)$  и, следовательно, множество  $E(a)$  является слабо секвенциально замкнутым в  $M$ .



## Доказательство леммы-2

Пусть теперь для каждого  $a \in \mathbb{R}^1$  множество  $E(a)$  слабо секвенциально замкнуто в  $M$  и пусть  $\{u_n\} \subset M$ , причем

$$u_n \rightharpoonup u_0 \in M \quad \text{слабо в } \mathbb{B}.$$

Тогда введем обозначение

$$\gamma = \liminf_{n \rightarrow +\infty} \psi(u_n).$$

Но тогда существует такая подпоследовательность  $\{u_{n_k}\} \subset \{u_n\}$ , что

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \psi(u_{n_k}) = \gamma.$$

## Доказательство леммы-3

Стало быть, при достаточно большом  $k \in \mathbb{N}$

$$u_{n_k} \in E(\gamma + \varepsilon) \quad \text{для всех } \varepsilon > 0,$$

но

$$u_{n_k} \rightharpoonup u_0 \in M \quad \text{слабо в } \mathbb{B},$$

поэтому в силу слабой секвенциальной замкнутости  $E(a)$  для каждого  $a \in \mathbb{R}^1$  приходим к выводу, что

$$u_0 \in E(\gamma + \varepsilon) \quad \text{для каждого } \varepsilon > 0.$$

Значит,  $u_0 \in E(\gamma)$ , т. е.

$$\psi(u_0) \leq \gamma = \liminf_{n \rightarrow +\infty} \psi(u_n),$$

т. е.  $\psi$  — это слабо секвенциально полунепрерывный снизу функционал на  $M$ .

Напомним теорему.

## Теорема

*Пусть  $\mathbb{B}$  — это рефлексивное банахово пространство, а  $M \subset \mathbb{B}$  — это слабо секвенциально замкнутое подмножество, тогда если функционал  $\psi(u) : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{R}^1$  является слабо коэрцитивным на  $M$  и секвенциально слабо полунепрерывным снизу функционалом на  $M$ , то он ограничен снизу на  $M$  и достигает своего минимума на  $M$  :*

$$\psi(u_0) = \inf_{u \in M} \psi(u) > -\infty.$$

**ПРИМЕР 2.** Рассмотрим следующую нелинейную краевую задачу:

$$\begin{cases} \Delta_p u = f(x) \in \mathbb{W}^{-1,p'}(\Omega), & p \in (2, +\infty), p' = p/(p-1), \\ u|_{\partial\Omega} = 0 & u(x) \in \mathbb{W}_0^{1,p}(\Omega), \end{cases} \quad (17)$$

где  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  — это ограниченная область с гладкой границей  $\partial\Omega \in \mathbb{C}^{2,\delta}$  при  $\delta \in (0, 1)$ , а символом  $\Delta_p u$  обозначен следующий нелинейный при  $p > 2$  оператор:

$$\Delta_p u(x) \equiv \operatorname{div}(|\nabla u(x)|^{p-2} \nabla u(x)).$$

**Определение 11.** Слабым решением задачи (17) назовем решение класса  $u(x) \in \mathbb{W}_0^{1,p}(\Omega)$ , удовлетворяющее равенству

$$\langle -\Delta_p u(x) + f(x), \varphi(x) \rangle = 0 \quad \text{для всех } \varphi \in \mathbb{W}_0^{1,p}(\Omega), \quad (18)$$

где  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  — это скобки двойственности между банаховыми пространствами  $\mathbb{W}_0^{1,p}(\Omega)$  и  $\mathbb{W}^{-1,p'}(\Omega)$ .

**Определение 12.** Слабой производной функции  $v \in \mathbb{L}^2(\Omega)$  в смысле скобок двойственности  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  между банаховыми пространствами  $\mathbb{W}_0^{1,p}(\Omega)$  и  $\mathbb{W}^{-1,p'}(\Omega)$ , называется следующая величина:

$$\left\langle \frac{\partial v}{\partial x_i}, w \right\rangle \equiv \left\langle v, -\frac{\partial w}{\partial x_i} \right\rangle = - \int_{\Omega} v(x) \frac{\partial w}{\partial x_i} dx \quad \forall w \in \mathbb{W}_0^{1,p}(\Omega), \quad i = \overline{1, N}.$$

В дальнейшем мы будем пользоваться данным определением слабой производной и говорить об интегрировании «по частям» в указанном смысле.

# Краевая задача для $p$ -лапласиана. Свойства $p$ -лапласиана

Прежде чем переходить к исследованию соответствующей вариационной задачи рассмотрим оператор  $\Delta_p$ . Докажем, что он удовлетворяет следующему свойству:

$$\Delta_p : \mathbb{W}_0^{1,p}(\Omega) \rightarrow \mathbb{W}^{-1,p'}(\Omega) \quad \text{при} \quad p \geq 2. \quad (19)$$

Действительно, этот оператор можно представить как композицию трех операторов:

$$\xi = \nabla u, \quad \eta = |\xi|^{p-2} \xi, \quad w = \operatorname{div} \eta.$$

# Краевая задача для $r$ -лапласиана. Свойства $r$ -лапласиана

Итак, пусть  $u \in \mathbb{W}_0^{1,p}(\Omega)$ , тогда

$$\xi = \nabla u : \mathbb{W}_0^{1,p}(\Omega) \rightarrow \mathbb{L}^p(\Omega) \times \cdots \times \mathbb{L}^p(\Omega),$$

$$\eta = |\xi|^{p-2}\xi : \mathbb{L}^p(\Omega) \times \cdots \times \mathbb{L}^p(\Omega) \rightarrow \mathbb{L}^{p'}(\Omega) \times \cdots \times \mathbb{L}^{p'}(\Omega), \quad p' = \frac{p}{p-1},$$

$$w = \operatorname{div} \eta : \mathbb{L}^{p'}(\Omega) \times \cdots \times \mathbb{L}^{p'}(\Omega) \rightarrow \mathbb{W}^{-1,p'}(\Omega).$$

Тем самым, свойство (19) доказано.



# Краевая задача для $p$ -лапласиана. Вариационная постановка

Сопоставим задаче (17) следующий функционал:

$$\psi(u) \equiv \psi_1(u) + \psi_2(u) = \frac{1}{p} \int_{\Omega} |\nabla u(x)|^p dx + \langle f, u \rangle \quad (20)$$

Найдем производную Фреше этого функционала. Производная Фреше второго слагаемого вычисляется элементарно:

$$\psi_2(u+h) - \psi_2(u) = \langle f, u+h \rangle - \langle f, u \rangle = \langle f, h \rangle$$

т. е.

$$\psi'_{2f}(u) = f \in \mathbb{W}^{-1,p'}(\Omega).$$

Вычислим теперь производную Фреше функционала

$$\psi_1(u) = \frac{1}{p} \int_{\Omega} |\nabla u(x)|^p dx : \mathbb{W}_0^{1,p}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}^1.$$

Действительно, заметим, что справедлива следующая формула

$$\begin{aligned} |\xi + \eta|^p &= \left( |\xi + \eta|^2 \right)^{p/2} = \left( |\xi|^2 + 2(\xi, \eta) + |\eta|^2 \right)^{p/2} = \\ &= |\xi|^p \left( 1 + \frac{2(\xi, \eta) + |\eta|^2}{|\xi|^2} \right)^{p/2} = |\xi|^p + \frac{p}{2} |\xi|^{p-2} 2(\xi, \eta) + \bar{o}(|\eta|) \end{aligned}$$

для всех  $\xi, \eta \in \mathbb{R}^N$  и малых  $|\eta|$ .

Из этой формулы вытекает, что если положить

$$\xi = \nabla u \quad \text{и} \quad \eta = \nabla h,$$

то справедливо следующее равенство:

$$\psi_1(u + h) - \psi_1(u) = \int_{\Omega} |\nabla u|^{p-2} (\nabla u, \nabla h) \, dx + \omega_1(u, h),$$

где

$$\lim_{\|\nabla h\|_2 \rightarrow 0} \frac{|\omega_1(u, h)|}{\|\nabla h\|_2} = 0.$$

# Краевая задача для $p$ -лапласиана. Производная Фреше-3

Заметим, что поскольку  $u \in \mathbb{W}_0^{1,p}(\Omega)$ , то

$$|\nabla u|^{p-2} \nabla u \in \mathbb{L}^{p'}(\Omega) \times \mathbb{L}^{p'}(\Omega) \times \cdots \times \mathbb{L}^{p'}(\Omega)$$

и поэтому имеет место равенство

$$\int_{\Omega} (|\nabla u(x)|^{p-2} \nabla u(x), \nabla h(x)) \, dx = \langle -\Delta_p u, h \rangle.$$

Таким образом, производная Фреше функционала  $\psi(u)$  равна

$$\psi'_f(u) = -\Delta_p u + f,$$

т. е. оператор

$$\mathbb{F}(u) \equiv -\Delta_p u + f : \mathbb{W}_0^{1,p}(\Omega) \rightarrow \mathbb{W}^{-1,p'}(\Omega)$$

является потенциальным.

# Краевая задача для $p$ -лапласиана. Проверка условий основной теоремы: слабая коэрцитивность

Теперь заметим, что по условию  $f \in \mathbb{W}^{-1,p'}(\Omega)$ , поэтому имеет место неравенство

$$|\langle f, u \rangle| \leq \|f\|_{-1,p'} \|\nabla u\|_p.$$

Следовательно, для функционала (20) справедлива следующая оценка снизу:

$$\psi(u) \geq \frac{1}{p} \|\nabla u\|_p^p - \|f\|_{-1,p'} \|\nabla u\|_p.$$

Введем обозначение

$$c = \|f\|_{-1,p'},$$

тогда имеем

$$\psi(u) \geq \frac{1}{p} \|\nabla u\|_p^p - c \|\nabla u\|_p. \quad (21)$$

# Краевая задача для $p$ -лапласиана. Проверка условий основной теоремы: слабая коэрцитивность

Пусть  $\varepsilon \in (0, 1)$ , тогда используя неравенство Юнга получим цепочку неравенств

$$c\|\nabla u\|_p = \frac{c}{\varepsilon^{1/p}}\varepsilon^{1/p}\|\nabla u\|_p \leq \frac{1}{p'}\left(\frac{c}{\varepsilon^{1/p}}\right)^{p'} + \frac{\varepsilon}{p}\|\nabla u\|_p^p.$$

Поэтому продолжим неравенство (21)

$$\psi(u) \geq \frac{1-\varepsilon}{p}\|\nabla u\|_p^p - c_1, \quad c_1 = \frac{1}{p'}\left(\frac{c}{\varepsilon^{1/p}}\right)^{p'}.$$

Следовательно,

$$\psi(u) \rightarrow +\infty \quad \text{при} \quad \|\nabla u\|_p \rightarrow +\infty$$

и поэтому функционал (20) является слабо коэрцитивным.

# Краевая задача для $p$ -лапласиана. Проверка условий основной теоремы: слабая секвенциальная полунепрерывность

Теперь докажем слабую секвенциальную полунепрерывность снизу функционала  $\psi(u)$  на  $\mathbb{W}_0^{1,p}(\Omega)$ . Действительно, пусть

$$u_n \rightharpoonup u_0 \quad \text{слабо в } \mathbb{W}_0^{1,p}(\Omega),$$

тогда в силу слабой секвенциальной полунепрерывности снизу нормы банахова пространства  $\mathbb{W}_0^{1,p}(\Omega)$  приходим к выводу, что

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} |\nabla u_n|^p dx \geq \int_{\Omega} |\nabla u_0|^p dx.$$

Кроме того, поскольку  $f \in \mathbb{W}^{-1,p'}(\Omega)$  имеет место предельное равенство

$$\langle f, u_n \rangle \rightarrow \langle f, u_0 \rangle \quad \text{при } n \rightarrow +\infty.$$

# Краевая задача для $p$ -лапласиана. Проверка условий основной теоремы: слабая секвенциальная полунепрерывность

Тем самым,

$$\psi(u_0) \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \psi(u_n).$$

Теперь можно воспользоваться теоремой 4, в которой следует взять  $M = \mathbb{W}_0^{1,p}(\Omega)$  при  $p \geq 2$ .

Существование слабого решения доказана.



# Краевая задача для $p$ -лапласиана. Единственность

Для полноты изложения докажем теперь единственность слабого решения рассматриваемой краевой задачи. Пусть единственности нет и  $u_1, u_2$  — это какие-то два разных решения задачи (17). Тогда согласно определению 13 слабого решения имеют место следующие два равенства:

$$\langle -\Delta_p u_k(x) + f(x), \varphi(x) \rangle = 0 \quad \text{для всех } \varphi \in \mathbb{W}_0^{1,p}(\Omega), \quad k = 1, 2.$$

Тогда, вычитая одно равенство из другого, получим следующее выражение

$$\langle -\Delta_p u_1 + \Delta_p u_2, \varphi \rangle = 0 \quad \text{для всех } \varphi \in \mathbb{W}_0^{1,p}(\Omega).$$

Теперь возьмем в качестве функции  $\varphi(x) \in \mathbb{W}_0^{1,p}(\Omega)$  следующее выражение

$$\varphi(x) = u_1(x) - u_2(x) \in \mathbb{W}_0^{1,p}(\Omega),$$

тогда сразу же получим равенство

$$\langle -\Delta_p u_1 + \Delta_p u_2, u_1 - u_2 \rangle = 0.$$

# Краевая задача для $p$ -лапласиана. Единственность

Откуда интегрируя по «частям», т. е. «перебрасывая» производную  $\nabla$  оператора  $\Delta_p$ , которая понимается в слабом смысле, получим следующее равенство

$$\int_{\Omega} \left( |\nabla u_1(x)|^{p-2} \nabla u_1(x) - |\nabla u_2(x)|^{p-2} \nabla u_2(x), \nabla u_1(x) - \nabla u_2(x) \right) dx =$$

Теперь заметим, что для произвольных векторов  $a, b \in \mathbb{R}^N$  имеет место цепочка следующих неравенств:

$$\begin{aligned} (|b|^{p-2}b - |a|^{p-2}a, b - a) &\geq 2^{-1} (|b|^{p-2} + |a|^{p-2}) |b - a|^2 \geq \\ &\geq 2^{2-p} |b - a|^p \quad \text{при } p \geq 2. \end{aligned}$$

Следовательно, приходим к неравенству

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\Omega} \left( |\nabla u_1(x)|^{p-2} \nabla u_1(x) - \right. \\ &\quad \left. - |\nabla u_2(x)|^{p-2} \nabla u_2(x), \nabla u_1(x) - \nabla u_2(x) \right) dx \geq \\ &\geq 2^{2-p} \|\nabla u_1 - \nabla u_2\|_p^p. \end{aligned}$$

Откуда легко следует, что  $u_1(x) = u_2(x)$  почти всюду на  $\Omega$ .